OTC
甲　类

布洛芬混悬液说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】通用名称：布洛芬混悬液
英文名称：Ibuprofen Suspension
汉语拼音：Buluofen Hunxuanye

【成　　份】本品每毫升含主要成份布洛芬20毫克，辅料为蔗糖、微晶纤维素羧甲纤维素钠共处理物、黄原胶、甘油、聚山梨酯80、无水枸橼酸、苯甲酸钠、草莓香精、树莓香精、新奇士橙香精、D&C黄色10号、诱惑红、纯化水。

【性　　状】本品为橙色混悬液，具水果香气。

【作用类别】本品为解热镇痛类非处方药药品。

【适 应 症】用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热。也用于缓解儿童轻至中度疼痛，如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛。

【规　　格】100毫升：2克

【用法用量】口服。12岁以下小儿用量见下表：

年龄（岁）	体重（公斤）	一次用量（毫升）	次数
1-3	10-15	4	若持续疼痛或发热，可间隔4-6小时重复用药1次，24小时不超过4次。
4-6	16-21	5	
7-9	22-27	8	
10-12	28-32	10	

使用前请摇匀。

【不良反应】1. 少数病人可出现恶心、呕吐、胃烧灼感或轻度消化不良、胃肠道溃疡及出血、转氨酶升高、头痛、头晕、耳鸣、视力模糊、精神紧张、嗜睡、下肢水肿或体重骤增。
2. 罕见皮疹、过敏性肾炎、膀胱炎、肾病综合征、肾乳头坏死或肾功能衰竭、支气管痉挛。
3. 其他不良反应包括：腹痛、乏力、无菌性脑膜炎、贫血、骨髓毒性、嗜酸性粒细胞增多、血小板减少、超敏反应、过敏、脑血管意外、精神运动过度活跃、视觉障碍、心衰、心肌梗死、心悸、出血（非消化道）、高血压、哮喘、支气管痉挛、便秘、腹泻、消化道出血、消化道炎症、消化道溃疡、消化道溃疡出血、消化道溃疡穿孔、口腔不适（局部烧灼感，刺激）、胰腺炎、肝毒性（肝功能异常、肝炎、转氨酶升高）、血管性水肿、伴嗜酸性粒细胞增多和全身系统症状药疹（DRESS）、红斑、多形性红斑、瘙痒、Stevens-Johnson综合征、中毒性表皮坏死松解症、荨麻疹、肾炎、肾脏损害、低体温、急性泛发性发疹性脓疱病（AGEP）、固定皮疹、胆管消失综合征、过敏性冠状动脉痉挛综合征。

【禁　　忌】1. 对其他非甾体抗炎药过敏者禁用。
2. 对阿司匹林过敏的哮喘患者禁用。
3. 对本品过敏者禁用。
4. 心脏手术前后禁用。

【注意事项】1. 本品为对症治疗药，不宜长期或大量使用，用于止痛不得超过5天，用于解热不得超过3天，症状不缓解，请咨询医师或药师。
2. 有下列情况患者慎用：支气管哮喘、肝肾功能不全、凝血机制或血小板功能障碍（如血友病）。
3. 下列情况患者应在医师指导下使用：有消化性溃疡史、胃肠道出血、心功能不全、高血压。
4. 1岁以下儿童应在医师指导下使用。
5. 不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品（如某些复方抗感冒药）。
6. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 由于持续的呕吐、腹泻或液体摄入不足而出现明显的脱水需就医，以纠正水及电解质平衡。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。因布洛芬可降低阿司匹林的保护心脏、中风和抗血小板活性的作用，正在服用阿司匹林的患者，应慎用本品。
13. 本品配有儿童安全盖，其打开方式见说明书所附图示。
14. 随着使用剂量和持续时间的增加、或伴有患者服用皮质类固醇、饮酒、抗凝剂、血小板聚集抑制剂（如阿司匹林）、其他非甾体抗炎药等因素，发生胃肠道出血、严重的心血管血栓性事件、心肌梗死、脑卒中和过敏性冠状动脉痉挛综合征的风险可能会增加。有心血管疾病或心血管疾病危险因素的患者，其风险更大。如出现胃肠道出血或溃疡、胸痛、气短、无力、言语含糊等情况，应停药并咨询医师。
15. 使用本品如出现过敏症状，尤其是对阿司匹林过敏的患者，应立即停药并咨询医师。过敏症状可能包括荨麻疹、面部肿胀、哮喘（喘鸣）、休克、皮肤发红、皮疹或水疱伴有或未伴有发热或红斑，严重的皮肤不良反应还包括多形性红斑、Stevens-Johnson综合征（SJS）、中毒性表皮坏死溶解症（TEN）、伴嗜酸粒细胞增多、全身系统症状的药疹（DRESS）和急性泛发性发疹性脓疱病（AGEP）。
16. 有下列情况患者慎用：肾脏疾病、肝脏疾病、心脏疾病、高血压、体液潴留、服用利尿剂。
17. 胃肠疾病患者应谨慎使用非甾体类抗炎药，包括消化性溃疡病、或其他胃肠道活跃的炎症性疾病，如溃疡性结肠炎或克罗恩病，由于非甾体类抗炎药可能会加剧病情。
18. 布洛芬治疗的发热和疼痛有时有可能是某种严重疾病的潜在征兆。如症状持续或恶化，或出现新的症状，患者应停药并咨询医生。
19. 布洛芬很少被报道会导致胆管消失综合征。如果患者出现突然腹痛或慢性腹痛，并伴有食欲丧失和/或新发瘙痒，应及时就医并咨询专业医生。

【药物相互作用】
1.本品与其他解热、镇痛、抗炎药物同用时可增加胃肠道的不良反应，并可能导致溃疡。
2.本品与肝素、双香豆素等抗凝药同用时，可导致凝血酶原时间延长，增加出血倾向。
3.本品与地高辛、甲氨蝶呤、口服降血糖药物同用时，能使这些药物的血药浓度增高，不宜同用。
4.本品与呋塞米（呋喃苯胺酸）同用时，后者的排钠和降压作用减弱；与抗高血压药同用时，也降低后者的降压效果。
5. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】本品能抑制前列腺素的合成，具有解热镇痛及抗炎作用。

【贮　　藏】遮光，密闭，不超过30℃保存。

【包　　装】口服液体药用高密度聚乙烯瓶，每瓶100毫升，每盒1瓶。

【有 效 期】24个月

【执行标准】药品注册标准YBH11572025

【批准文号】国药准字H20254482

【说明书修订日期】2025年06月27日

【上市许可持有人】
名　　称：青岛黄海制药有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区科苑经四路17号
邮政编码：266101
电话号码：4007089177 0532-88704020
网　　址：www.qdhuanghai.com

【生产企业】
企业名称：青岛黄海制药有限责任公司
生产地址：青岛市崂山区科苑经四路17号
邮政编码：266101
电话号码：4007089177 0532-88704020
网　　址：www.qdhuanghai.com

如有问题可与上市许可持有人联系

瓶盖开启/关闭法



·开启时需用力按下外瓶盖同时反时针方向转动，即可打开。
·关闭时顺时针方向拧紧外瓶盖即可